

*Surnia ulula*  
Famille : Strigidae

# Chouette épervière

Je suis un oiseau aux personnalités multiples! De l'épervier, j'ai la longue queue et les ailes pointues; cette queue, je l'agite comme la crécerelle d'Amérique lorsque je fais le guet au sommet d'une épinette. Comme cet oiseau, je suis capable de voler sur place. J'ai aussi une encoche sur le bec, comme un faucon. Je suis la seule chouette qui est strictement diurne. Je chasse d'ailleurs plus à la vue qu'en utilisant mes oreilles. Contrairement aux autres hiboux, mes oreilles sont symétriques et mon disque facial est peu développé. En vol, on peut me confondre avec un épervier.

Je suis une nomade; je me déplace au fil des saisons, mais je ne suis pas considérée comme un oiseau migrateur. En cas de famine, je m'aventure au sud de la forêt boréale.

*Surnia ulula*  
Family : Strigidae

## Northern Hawk Owl

*I am a bird with multiple personalities! From the Sharp-Shinned Hawk, I get my long tail and pointed wings; my tail, I wag just like the American Kestrel does as I watch for prey from atop spruce trees. I am even capable of hovering, American Kestrel style! Like a falcon, I have a notch on my beak. I am the only owl that is strictly diurnal. In fact, I hunt more by sight than sound. Contrary to other owls, my ears are symmetrical and my facial disc is under-developed. In flight I am often mistaken for a Sharp-Shinned or Cooper's Hawk.*

*I am nomadic. I move from place to place as seasons pass but I am not considered a migrating bird. During seasons of food shortage, I'll venture south of the boreal forest.*



Dimensions

Longueur / Length 36,5 - 43 cm  
Poids / Weight M : 299 g F : 345 g  
Envergure / Wing span 83,8 cm

Petits mammifères /  
Small mammals

Forêt boréale /  
Boreal forest

10 ans en nature et en captivité /  
10 years in the wild and in captivity



Reproduction

1 couvée par an; 5-7 œufs;  
incubation 25-30 jours; le couple  
dure au moins jusqu'au printemps  
suivant; le mâle peut avoir plus  
d'une partenaire /  
1 brood per year; 5-7 eggs;  
incubation 25-30 days; couples  
last until at least the following  
spring; males may have more than  
one partner



**SITUATION** Mon espèce est désignée « non en péril » au niveau canadien, ce qui veut dire que je me porte bien et qu'aucune menace importante à ma survie n'a été identifiée.

**STATUS** My species is designated "Not at risk" at the Canadian level, which means that I presently fare well, and that no major threat to my survival has been identified.



### SAVIEZ-VOUS?

Je niche tôt au printemps; il peut encore faire froid au début mai dans la forêt boréale. Pas de problème, j'ai ce qu'il faut! Ma plaque incubatrice est l'une des plus efficaces et des plus grandes chez les hiboux. Au moment de couvrir, je perds mes plumes sous mon ventre. Cette zone de peau nue est très riche en vaisseaux sanguins. La chaleur de mon corps se transmet facilement et je garde mes œufs et mes oisillons bien au chaud.

### DID YOU KNOW?

I nest early in the spring, even as the temperature remains low in early May in the boreal forest. No Problemo, I've got what it takes! My incubation patch is one of the largest and most efficient of all owls. When it is time to nest, I shed the feathers on my lower belly. This zone of bare skin is very rich in blood vessels. My body heat is easily transferred through it, thereby keeping my eggs and hatchlings warm and toasty.

